

**Somalgin Cardio** (ácido acetilsalicílico tamponado) **APRESENTAÇÕES:** Comprimidos revestidos dupla camada de 81mg e 200mg, embalagem contendo 4, 10, 30, 32 ou 60 comprimidos. Comprimidos revestidos dupla camada de 100mg e 325mg, embalagem contendo 4, 32 ou 60 comprimidos. Uso oral. Uso adulto e pediátrico (pediátrico apenas para apresentação de 100mg). **INDICAÇÕES:** é indicado para reduzir o risco de ataques isquêmicos transitórios recorrentes (AITs); nos pacientes com histórico de isquemia cerebral transitória devido à embolia fibrinoplaquetária, assim como para reduzir o risco de infarto do miocárdio (IM), fatal ou não; nos pacientes com história de infarto prévio ou de angina pectoris instável. Prevenção de trombose coronariana em pacientes com fatores de risco, prevenção de trombose venosa e embolia pulmonar. Somalgin Cardio é também indicado como medicação analgésica, antitérmica e anti-inflamatória. Utilizado para o alívio das dores de cabeça, mal-estar, febre das gripes e dos resfriados comuns, e nas condições febris de maneira geral; nas dores musculares fortes a moderadas; no alívio temporário das dores moderadas da artrite, reumatismo, lumbago, ciática; nas dores de dente, neuralgias e neurites; nas dores funcionais da menstruação; na insônia decorrente de estados dolorosos leves; no mal-estar e nas febris pós-imunizações.. **CONTRAINDICAÇÕES:** é contraindicado a todos os pacientes com hipersensibilidade ao ácido acetilsalicílico, a qualquer componente da fórmula e a produtos que contenham anti-inflamatórios não esteroidais (por exemplo: diclofenaco, piroxicam, meloxicam, dipirona, paracetamol, ibuprofeno, nimesulida). Também é **contraindicado na asma induzida pela administração de salicilatos, úlceras pépticas ativas**, diátese hemorrágica, no último trimestre da gravidez, em combinação com metotrexato em dose de 15 mg/semana ou mais, síndrome de Reye e doença viral. **ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES:** nos dois primeiros trimestres da gravidez, só deverá ser usado por recomendação médica, em casos de absoluta necessidade. No caso de Dengue deve-se evitar o uso, já que seu uso pode favorecer o aparecimento de manifestações hemorrágicas. O ácido acetilsalicílico não deve ser utilizado em pacientes predispostos a dispepsias ou portadores de alguma lesão da mucosa gástrica conhecida. Mesmo em doses baixas pode aumentar o tempo de sangramento. A administração deve ser cautelosa nos pacientes com função renal comprometida, particularmente nas crianças, e sempre que o paciente estiver desidratado. Pacientes que consomem bebida alcoólica todos os dias estão sujeitos a hemorragia caso utilizem este medicamento. Não deve ser utilizado por períodos prolongados sem a orientação médica. Gravidez e lactação: Durante a gravidez ou amamentação, consulte seu médico antes de utilizar Somalgin Cardio. Sabe-se que o ácido acetilsalicílico, quando administrado continuamente e em altas doses, pode provocar problemas no parto e/ou no recém-nascido. Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após seu término. Informar ao médico se estiver amamentando. Crianças ou adolescentes não devem usar esse medicamento para catapora ou sintomas gripais antes que um médico seja consultado sobre a síndrome de Reye, uma rara, mas grave doença associada a esse medicamento. **REAÇÕES ADVERSAS:** Reações muito comuns (>1/10): dor abdominal com cólicas, diarreia, disgeusia, condições hipersecretórias gástrica, irritação gastrointestinal, azia, náuseas, vômitos. Reação comum (>1/100 e <1/10): obstipação. **INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:** risco aumentado de sangramento: anisindiona, estreptoquinase, anticoagulantes, citalopram, clovoxamina, desvenlafaxina, dicumarol, duloxetina, eptifibatide, escitalopram, femoxetina, flesinoxano, **fluoxetina**, fluvoxamina, ginkgo, milnaciprana, nefazodona, paroxetina, sertralina, tecneteplase, ticlopidina, tirofibana, venlafaxina, verapamil e zimeldina. Redução da eficácia de outros medicamentos: captopril, delapril, enalaprilato, maleato de enalapril, imidapril, temocapril. Redução dos níveis de salicilato no plasma do efeito antiplaquetário do ácido acetilsalicílico: ranitidina. Aumento no risco de desenvolvimento da Síndrome de Reye: vacina para os vírus da gripe e varicela. Risco aumentado de sangramento de hematoma no caso de anestesia neuroaxial. Redução do efeito antiplaquetário do ácido acetilsalicílico: Ibuprofeno. Prolongamento no tempo de sangramento: diltiazem. Risco aumentado de ulceração gastrointestinal e concentração subterapêutica de ácido acetilsalicílico: betametasona, cortisona, deflazacorte, dexametasona, hidrocortisona, metilprednisolona, parametasona e triancinolona. Risco aumentado de sangramento gastrointestinal: celecoxibe e rofecoxibe. Hemorragia gastrointestinal: piroxicam. Hipoglicemia: clorpropamida e tolbutamida. Risco aumentado de hipoglicemia: gliburida. Redução da eficácia da outra droga: furosemida, lisinopril e corticosteroides. Toxicidade pela outra droga: metotrexato (leucopenia, trombocitopenia, anemia, nefrotoxicidade, ulcerações de mucosa). Aumento nas concentrações de nitroglicerina e depressão adicional da função plaquetária: nitroglicerina. Níveis séricos aumentados de urato: fenilbutazona. Reversão dos efeitos uricosúricos da outra droga: probenecida. Aumento na toxicidade por salicilato: tamarindo. Aumento nas concentrações de ácido valpróico livre: ácido valpróico. Álcool: riscos de hemorragia Planta Medicinal: risco aumentado de sangramento: anis, arnica, astragalus, bilberry (mirtilo), black currant (cassis), bladderwrack (tipo de algas marrons), bogbean (Menyanthes), boldo, borage, chaparral, curcumin, dente-de-leão, gengibre, guggul, hawthorn, kava, licorice (Alcaçuz), matricária, meadowsweet, motherwort, óleo de cravo, prímula, skullcap, Arranhadura de gato, capsaicina. Alimento: risco aumentado de sangramento: aipo e alho. **POSOLOGIA:** Somalgin Cardio comprimido revestido deve ser ingerido com um pouco de líquido, durante ou após as refeições. Nas patologias abaixo, são recomendadas as seguintes doses para adultos: Prevenção primária de infarto do miocárdio em pessoas com risco moderado ou alto de eventos cardiovasculares: Dose diária de 81 a 162 mg. Angina estável crônica: Dose diária de 81 a 162 mg. Síndromes coronarianas agudas (angina instável, infarto agudo do miocárdio): Dose imediata de 81 a 325 mg, seguida por dose diária de 81 a 162 mg. Prevenção secundária de infarto do miocárdio: Iniciar com dose diária de 162 a 325 mg, e manter indefinidamente com 81 a 162 mg/dia. Prevenção primária de AVC (acidente vascular cerebral) em pacientes que apresentaram AIT (ataques isquêmicos transitórios) ou antes e após endarterectomia carotídea: Dose diária de 81 a 325 mg. AVC agudo isquêmico (em pacientes que não receberão trombólise): Iniciar com dose diária de 162 a 325 mg, preferencialmente nas primeiras 48 horas do evento. Prevenção secundária de AVC não-cardioembólico (aterotrombótico, lacunar ou criptogênico): Dose diária de 81 a 325 mg. Prevenção de tromboembolismo após cirurgia vascular ou outras intervenções: Dose diária de 81 a 325 mg. Prevenção de trombose venosa profunda e embolia pulmonar após imobilização prolongada: Dose diária de 81 a 200 mg ou 325 mg em dias alternados. Para ação analgésica, antipirética e anti-inflamatória: Adultos: 2 comprimidos de 325 mg inicialmente como dose de ataque e 1 comprimido de 325 mg a cada 6 ou 8 horas como manutenção. Crianças: Somalgin Cardio 100 mg: Crianças até 1 ano de idade: a critério médico. Crianças de 1 a 2 anos: 1 comprimido. Crianças de 3 a 5 anos: 1 a 2 comprimidos. Crianças de 6 a 9 anos: 2 a 3 comprimidos. Crianças de 10 a 12 anos: 4 a 5 comprimidos. Estas doses podem ser repetidas até 3 vezes ao dia, podendo variar segundo orientação médica. Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado. **Registro MS: nº 1.3569.0647. Registrado por: EMS SIGMA PHARMA LTDA. “SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO” “NÃO USE ESTE MEDICAMENTO EM CASO DE GRAVIDEZ, GASTRITE OU ÚLCERA DO ESTÔMAGO E SUSPEITA DE DENGUE OU CATAPORA”. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.**